

**СОДЕРЖАНИЕ КОРОВ
ВО ВРЕМЯ СТЕЛЬНОСТИ
И В РАННИЙ
ПОСЛЕОТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД**



Диагностика беременности и отел.

Телят, полученных от весенних отелов, отнимают от коров осенью, когда они достигают семи-девятимесячного возраста. Коровы и ремонтные нетели к этому времени находятся на втором — пятом месяце стельности. Кормление нестельных телок и коров в зимний период обходится во столько же, что и кормление стельных животных. Поскольку нестельные коровы не оправдывают затрат на их зимнее кормление, их необходимо выбраковать из стада. Проверку на стельность лучше проводить при отъеме телят и в это же время выбраковать нестельных коров.

Диагноз на стельность можно проводить через 35 дней после осеменения. Однако при этом возникает опасность гибели эмбриона при пальпации его в возрасте менее 50 дней. Если нет экономически обоснованных причин спешки постановки диагноза на стельность, то наиболее подходящее время проверки пальпацией в период отъема телят с целью выбраковки неосеменившихся животных и отбора стельных нетелей.

Всегда надо придерживаться строгой позиции по отношению к неосеменившимся коровам: их необходимо выбраковывать и заменять осемененными телками. Недостаточная выбраковка по плодовитости снизит продуктивность стада в будущих поколениях.

Кормление коров перед отелом.

Масса плода коровы более чем наполовину увеличивается во второй половине стельности, особенно за последние два месяца перед отелом. Именно в этот период нагрузка от плода на организм матери самая большая. Если в рационе недостаточно содержится энергии, то расходуются запасы тела коровы и она теряет упитанность. В стадах, где отелы запланированы на весну, это время совпадает, к сожалению, с периодом самого низкого поступления кормов. В связи с этим особое значение имеет кормление в последние 60—90 дней беременности.

При кормлении кроссбредных коров и телок в последние 60—90 дней перед отелом рационами как с высоким, так и с низким содержанием энергии лучше результаты были с энергонасыщенными рационами. У животных, которые получали менее насыщенные энергией рационы, не было большой разницы по живой массе телят при рождении с другой группой, число затрудненных отелов было несколько меньше, однако удлинился промежуток от отела до первой течки, меньшее число животных пришло в охоту до начала случного сезона, ниже была оплодотворяемость.

Исследователи университета штата Вайоминг сообщили, что телята, полученные от первотелок, которые недополучали корм в последний месяц стельности, имели живую массу при рождении на 3,6 кг и при отъеме на 11,8 кг ниже, чем телята, полученные от первотелки, которых кормили нормально. Несмотря на то что первотелки, которых недокармливали в последние месяцы беременности, во время лактации получали дополнительную подкормку, разница в живой массе полученных от них телят и телят от первотелок с нормальным уровнем кормления к отъему увеличилась, подтверждая последствия действия на развитие теленка недостаточного уровня энергии в рационе для глубокостельных животных. Кроме того, такие телята были менее жизнеспособны. Когда сопоставили влияние низких приростов и низкой жизнеспособности на показатель выхода телят на одну первотелку, важность правильного кормления животных перед отелом стала еще более очевидна.

В период перед отелом поступление энергии с кормом должно быть достаточным, для того чтобы обеспечить питательными веществами как корову, так и развивающегося теленка. Это особенно важно для первотелок, потому что во время стельности они еще продолжают расти и развиваться.